



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کیلان  
مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

## راهنمای مراقبت پس از جراحی مجرای اشکی (DCR)

- ۱- جهت جلوگیری از خونریزی و کبودی از کیسه یخ روی بینی ( ناحیه عمل) استفاده کنید.
- ۲- از فین کردن و زور زدن خودداری نمایید.
- ۳- با دستور پزشک تا سه روز تا یک هفته از استحمام خودداری نمایید و پس از آن از آب ولرم جهت استحمام استفاده کنید.

۱- دستورات دارویی بعد از عمل به شرح زیر می باشد:

- ✓ قطره کلرآمفنیکل هر ۸ ساعت داخل چشم سمت عمل شده چکانده شود.
- ✓ قطره بتامتازون هر ۸ ساعت داخل چشم سمت عمل شده چکانده شود.
- ✓ قطره فنل افرین چشمی هر ۶ ساعت داخل بینی سمت عمل شده تا ۳ روز چکانده و سپس قطع شود.
- ✓ اسپری بکلومتازون هر ۱۲ ساعت داخل بینی سمت عمل شده اسپری شود.
- ✓ کپسول سفالکسین هر ۶ ساعت میل شود.
- ✓ پماد بتامتازون و تتراسایکلین هر ۱۲ ساعت روی ناحیه بخیه مالیده شود.

\*البته هر کدام از دستورات دارویی بالا ممکن است بر اساس صلاحدید پزشک معالج تغییر نماید.

**علایم هشدار دهنده جهت مراجعه به اورژانس: خروج ترشحات چرکی ، خونریزی ،  
تورم چشم ، قرمزی مداوم چشم ، درد و تب**

واحد آموزش به بیمار