

برگه آموزش به بیمار بعد از عمل ازوفاگوسکوپی

- ۱- به بیمار توصیه میشود که در صورت بوجود آمدن تب، درد قفسه سینه و درد پشت ، تنگی نفس ، تپش قلب به اورژانس مراجعه کند.
- ۲- به بیمار توصیه می شود لقمه های غذا را بطور کامل جویده و سپس میل کند تا از گیر کردن تکه های بزرگ گوشت جلوگیری شود.
- ۳- به بیمار توصیه می شود هنگام خوردن مرغ توجه لازم را به عدم وجود استخوان مرغ داشته باشد.
- ۴- به بیمار توصیه می شود تا ۲۴ ساعت بعد از ترخیص از خوردن غذای سفت خودداری کند.
- ۵- به بیمار توصیه می شود در صورت شل بودن دندان مصنوعی به دندانپزشک مراجعه کند.
- ۶- به پدران و مادران توصیه می شود که از قرار دادن سکه، باتری ، اجسام تیز و خوراکی هایی مانند بادام زمینی ، نخود و ... در جلوی اطفال خودداری کند.
- ۷- درد مختصر گلو تا چند روز بعد از عمل طبیعی است.

علایم هشدار دهنده جهت مراجعه بعدی: مچکی نفس- بی‌ترس تنگی- تب بالا- خونریزی از حلق، درد پشت، درد قفسه سینه، تورم کردن