



برگه آموزش به مددجویان DCR در زمان ترخیص (ویژه چشم)

جهت جلوگیری از خونریزی و کبودی از کیسه یخ روی بینی (ناحیه عمل) استفاده می شود.

۱- از فین کردن و زور زدن خودداری نمایید.

۲- تا ۳ روز از استحمام خودداری نمایید و پس از آن از آب ولرم جهت استحمام استفاده شود.

۳- دستورات دارویی بعد از عمل به شرح زیر می باشد:

✓ قطره کلرآمفنیکل هر ۸ ساعت داخل چشم سمت عمل شده چکانده شود

✓ قطره بتامتازون هر ۸ ساعت داخل چشم سمت عمل شده چکانده شود

✓ قطره فنل افرین چشمی هر ۶ ساعت داخل بینی سمت عمل شده تا ۳ روز چکانده و سپس قطع

شود

✓ اسپری بکلومتازون هر ۱۲ ساعت داخل بینی سمت عمل شده اسپری شود

✓ کپسول سفالکسین هر ۶ ساعت میل شود

✓ پماد بتامتازون و تتراسایکلین هر ۱۲ ساعت روی ناحیه بخیه مالیده شود

علایم، مشاوره منته بهت مراجعه بعدی: خروج ترشحات چرکی، خونریزی، تورم چشم، قرمزی مداوم چشم، درد و تب

واحد آموزش به بیمار