

عمل جراحی ترمیم پرده گوش :

پرده گوش در انتهای کانال گوش قرار دارد و گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند . آسیب پرده گوش، عوارض متعددی از جمله کم شنوایی، سرگیجه، عفونت گوش میانی و ترشحاتی از گوش میانی را به دنبال دارد.

تیمپانوپلاستی: در ترمیم پرده گوش یا (Tympanoplasty)، استخوانچه های کوچک گوش میانی که آسیب دیده اند، ترمیم می شوند.



ملاحظات بعد از عمل تیمپانوپلاستی:

بعد از انجام عمل تیمپانوپلاستی، فرد ممکن است برای مدت چند روز ترشحاتی از گوش داشته باشد و خونریزی خفیفی را از مجرای گوش خود تجربه کند. این موارد طبیعی است و جای نگرانی ندارد. علاوه بر آن ممکن است احساس درد در ناحیه گوش و مجرای گوش داشته باشد، ولی این علائم طی مدت چند روز برطرف می شود.

هشدارهای مهم بعد از عمل تیمپانوپلاستی:

فردی که تحت عمل تیمپانوپلاستی قرار گرفته است، باید برای چند هفته، مراقبت های لازم بعد از عمل جراحی را در نظر بگیرد و به پزشک خود مراجعه کند. اگر پزشک او اجازه داد به حمام برود و برای حمام کردن، نکات ضروری و لازم را از پزشک سؤال کند.

در صورتی که آب وارد گوش فرد شود، به احتمال بسیار زیاد عفونت گوش ایجاد می شود به دلیل رفتن آب در گوش در طی حمام کردن، این گونه افراد باید قبل از حمام، پنبه ای را گرد کرده و آن را با وازلین چرب کنند و بر روی لاله گوش خود طوری قرار دهند که از ورود هر گونه آب و مواد دیگر به داخل گوش

جلوگیری شود. در صورتی که آب وارد گوش فرد شود، به احتمال بسیار زیاد عفونت گوش ایجاد می شود.

- سعی کنید حتما ناحیه عمل شده را تمیز نگه دارید.

- از ورزش هایی مانند شنا که با آب در تماس هستید، باید خودداری کنید. به یاد داشته باشید که کم شنوایی ناشی از ماه پس از ۳ تا ۲ آسیب به پرده گوش، حدود عمل جراحی تیمپانوپلاستی برطرف می شود پس در طول این مدت، نگران شنوایی خود نباشید.

پرده گوش سالم

پرده گوش پاره شده





تمپانوپلاستی

(ترمیم پره گوش)

(ویژه مددجو)

واحد آموزش به بیمار

پاییز ۹۷ - کد سند: NE-PL-09



نشانی
مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع)
رشت

تلفن: ۸-۳۳۲۳۸۳۰۶

منابع:

- گایدلاین مراقبتهای پرستاری در بیماری های چشم و گوش و حلق و بینی تدوین: نسترن جعفریان
کارشناس پرستاری مدیریت پرستاری
- برونر سودارت پرستاری داخلی جراحی (چشم و گوش)، ترجمه منصوره علی اصغر پور و طاهره نجفی
انتشارات جامع نگر، ۲۰۱۸

نکاتی که بعد از عمل جراحی تمپانوپلاستی باید رعایت کرد:

از دمیدن هوا در بینی خودداری کنید، هر گونه مسافرت هوایی با هواپیما را به بعد از زمان بهبودی کامل موکول کنید. فشار ناشی از اختلاف فشار هوا، سبب بدتر شدن علائم ناشی از عمل می شود، از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید، زیرا فشار ناشی از آن ممکن است به گوش فشار بیاورد.

عوارض احتمالی آن عبارتند از:

ن است سوراخ پرده گوش دوباره برگردد. یکی از عوارض این عمل، پیوند نخوردن بافت است و ممکن است پرده گوش التیام نیابد. این مورد در افرادی دیده می شود که سابقه جوش نخوردن زخم را دارند. از عوارض دیگر میتوان به بروز عفونت، آسیب های عصبی، کم شنوایی یا از دست دادن شنوایی، وزوز گوش به دلیل پارگی پرده گوش می باشد. سوراخ شدن پرده گوش، فنگ شدگی کانال گوش، آسیب گوش میانی، ایجاد چسبندگی در گوش میانی، فیستول پری نف، آسیب عصب صورت، عفونت گوش میانی، بروز کلسیاتوم می باشد.